

7. EXAMEN DES TRACES DE MORSURES ET DE CONSOMMATION

- Carcasse non retrouvée ; traces de sang et présence de poils et/ou de contenu de panse et/ou d'esquilles d'os...
- Carcasse (totale ou partielle) décharnée et desséchée
- Dépouille intacte (sans morsures) ou très peu consommée (d'éventuelles traces de morsures ne peuvent pas être masquées)
- Carcasse (totale ou partielle) décharnée (accompagnée de lambeaux de chair fraîche)
 - ✓ **Localisation des morsures accompagnées d'hématomes (à observer nécessairement sur peau écorchée, face interne) :**
 - gorge seulement (larynx ; larynx et sous les oreilles)
 - autre zone du cou seulement (nuque, tiers inférieur)
 - gorge et autre zone du cou
 - gorge et une autre localisation sur le restant du corps
 - gorge et plusieurs autres localisations sur le restant du corps
 - une ou plusieurs localisations sur le corps, aucune sur le cou
 - ✓ **Profondeur des morsures**
 - Très profondes (> 10mm)
 - Peu profondes (< 10 mm)
 - ✓ **Impact(s) sur les voies respiratoires lié(s) à des morsures à la gorge accompagnées d'hématomes (en dehors de toute consommation ultérieure):**
 - aucun
 - perforation(s)
 - sectionnement ou broyage
 - ✓ **Diamètre des perforations accompagnées d'hématomes mesuré sur la peau écorchée, hors agrandissement par corvidés (nombre de perforations supérieur ou égal à 6)**
 - Plus de 50% des perforations ont un diamètre minimum **inférieur** ou égal à 3 mm
 - Plus de 50% des perforations ont un diamètre minimum **supérieur** à 3 mm
 - ✓ **Estimation de la masse totale de chair consommée (hors consommation par charognards):**
 - < 3 kg
 - de 3 à 5 kg
 - de 5 à 10 kg
 - de 10 à 25 kg
 - Plus de 25 kg
 - ✓ **Localisation des parties consommées (hors consommation par charognards):**
 - viscères abdominaux (panse en particulier)
 - cou
 - membre(s) antérieur(s)
 - membre(s) postérieur(s)
 - viscères thoraciques
 - autre localisation :
 - consommation totale
 - aucune consommation
 - ✓ **Mode de consommation (hors consommation par charognards):**
 - proie recouverte
 - os des membres décharnés et en connexion anatomique
 - peau proprement écorchée et/ou retournée en chaussette sur les membres
 - os des membres brisés (par le prédateur)
 - consommation par ouverture de la cavité thoracique ou abdominale
 - Panse à proximité de la carcasse

Commentaires :
.....
.....
.....